

國際奧伊斯嘉香港總會 新界國際聯青社  
西北聯青社 東區聯青社  
元朗大會堂 洪水橋居民福利會 主辦

# 愛護大自然計劃

之


## “認識華南常見的樹木”

為鼓勵青少年加強對生物多樣性的認識和實踐，各合辦單位本著共同理念，推出一項為期五年之愛護大自然計劃－多元系列活動，藉著認識周遭環境之生物及其互動的重要性，期以鼓勵青少年保護環境，愛護大自然，愛護地球，符合聯合國訂定之可持續發展目標



花名: 燈籠花 學名: *Abutilon Megapotamicum* 科: 錦葵科

原產秘魯、智利、及波利維亞等中、南美洲國家。花色有紅、紫、白三個品種供觀賞用，花期可長達全年，農曆年的1-3月為最盛開。燈籠花生長的花總是整齊、對稱的，而且很像燈籠，就像貼在燈籠上的剪紙。燈籠在中國代表的是吉祥、安寧。花語是感恩、謝錯。



樹名: 秋茄樹 學名: *Kandelia obovate* 科: 紅樹科 屬: 秋茄屬

主要生長於越南北面、海南、香港等地。秋茄常成為優勢群，聚生一起抵抗風浪，河口有源源不絕的營養，聚生沒有競爭營養的問題。花期在4至8月間，果期在8至4月間。



樹名: 細葉榕 學名: *Ficus microcarpa* 科: 桑 屬: 榕屬

炎熱潮濕地區生長，在南中國、香、馬來西、台等地方很常見。細有質表面，是常綠植，生命力頑強但生長緩慢，有濃密及廣闊的樹冠，枝條垂下大量鬚狀氣根。當碰觸到泥土表面，會形成新的樹幹。花藏在無花果內。



樹名: 棕櫚樹 學名: *Arecaceae* 科: 棕櫚科 屬: 檳榔屬

絕大部分棕櫚樹生活在熱帶或亞熱帶地區，以熱帶美洲和熱帶亞洲為分布中心，中國秦嶺以南地區均有分佈，常用於庭院、路邊及花壇之中，適於四季觀賞，及具有經濟價值的主要有椰子、檳榔、棕櫚、棗椰等。4-5月開花，花小而黃白色，10-11月秋天熟時，花呈青黑色。



花名: 山茶花 學名: *Camellia japonica* 科: 山茶科

原產於華東地區，現分佈於長江流域、臺灣，及朝鮮、日本和印度等地。山茶有一千多年的栽培歷史，是世界名花之一。山茶是重慶市、山東青島市及台灣新竹縣等地的縣花，亦是日本銚子市的市花。花期為 10 月到翌年 5 月。



樹名: 黃桐 學名: *Endospermum chinense* Benth. 科: 大戟科 屬: 黃桐屬  
生於海拔 600 米以下山地常綠林中，並產於福建南部、廣東、海南、廣西和雲南南部。、印度東北部、緬甸、泰國、越南也有分佈。花期為 5-8 月，果期為 8-11 月。黃桐可用作中藥，主治手足浮腫、頭髮脫落和跌打損傷等等。



樹名: 牙香樹 學名: *Aquilaria sinensis* 科: 瑞香科 屬: 沉香屬

又名土沉香，是香港原生稀有的雙子葉植物，被列國家保護野生樹種。

主要分布於西南沿海濕地地區，為耐鹽的紅樹林伴生植物。花期為4月，果期為7月，長有黃綠色細花且有微香，每年5月結成木質蒴果，成熟時轉黑。樹脂帶有香氣，被製成嶺南名貴的香料，且具有藥用價值。製成品包括鈔票紙、肥皂等。



花名: 朱槿 學名: *Hibiscus rosa-sinensis* 科: 錦葵科

原產於中國南部。由於早期花色大多為紅色，中國嶺南一帶將之稱為大紅花，也是馬來西亞國花。朱槿不但擁有觀賞價值，還有食用及中醫藥用用途。主要繁殖方法是扦插法或嫁接法。花語為纖細美、體貼之美、永保清新之美。



花名: 劍蘭 學名: *Gladiolus* 科: 鳶尾科

劍蘭原產於南非，四季皆可開花。劍蘭不但有觀賞用途，劍蘭的球莖還有藥用成份，例如: 解毒散瘀，消腫止痛。當每朵花皆有劍狀的苞片保護著，花色有紅、黃、白、粉紅及紫紅等。



樹名: 楓香 學名: *Liquidambar formosana* 科: 楓香科 屬: 楓香屬

原產於中國南部及台灣。本種為陽性植物，喜好陽光、耐蔭、耐火、抗有毒氣體及抗風寒，深根性，喜生於濕潤、肥沃的酸性及中性壤土。常有樹脂，乾後棕黑色，有光澤。楓香樹的枝幹可採樹脂供製線香及藥



樹名: 白千層 學名: *Melaleuca quinquenervia* 科: 桃金娘科 屬: 白千層屬  
生長在澳洲的一個植物屬，主要生長在靠近水邊或沼澤地邊緣。一些昆蟲以千層樹的葉為食。作為長綠樹，樹皮一層層剝落，花沿著樹幹生長，顏色有白色、粉紅色、紅色、黃色和綠色。千層樹提煉的油可以應用到食品和醫藥工業中，因其具有抑制細菌的功用。




花名: 菊花 學名: *Chrysanthemum* 科: 菊科

原產於中國華北地區。菊花是中國花中四君子(梅蘭竹菊)之一，也是世界四大切花(菊花、月季、康乃馨、唐菖蒲)之一，產量居首。中國人有重陽節賞菊和飲菊花酒的習俗，有著吉祥、長壽的花語。花期可分為夏菊、秋菊、寒菊，一般持續 20-35 天左右。




花名: 玫瑰 學名: *Rosa rugosa* 科: 薔薇科

玫瑰原產地中國華北地區(山東、甘肅、昆明等)、日本和朝鮮。枝條較為柔弱軟垂且多密刺，每年花期只有一次，花有紫紅色、白色及紅色等。花期為 5-6 月，果期為 8-9 月。玫瑰的一個重要用途是提製香精油，亦可食用和藥用功效。玫瑰象徵著美麗和愛情。



樹名: 桉樹 學名: *Eucalyptus* 科: 桃金娘科 屬: 桉屬

澳洲木本植物中最具代表性的樹種。枝、葉花有芳香；葉子通常互生，有柄，全緣羽狀脈，多為鐮刀形；早春開白色、紅色或黃色花，多為傘形或頭狀花序，萼片與花瓣連合成帽狀體（花蓋），開花時脫落；蒴果成熟時頂端 3 – 5 裂；種子多數有角稜。樹葉為澳洲特有種動物無尾熊的唯一食物來源。




樹名: 樟樹 學名: *Cinnamomum camphora* 科: 樟科 屬: 樟屬

原產於越南、中國長江以南、台灣、韓國、日本，生長於濕潤的山谷、山腰下、河流兩岸、路旁等。樟樹散發著特有清香氣息。樟樹成熟期為10-11月，成熟時由綠色轉為黑紫色，果皮呈紫黑色，有光澤。樟樹枝葉濃密、樹形美觀，可作行道樹及防風林。



花名: 茉莉花 學名: *Jasminum sambac* (L.) Ait 科: 木犀科

原產地為印度、巴基斯坦、阿拉伯一帶。花期5-8月，果期7-9月。茉莉的花極香，為著名的花茶原料及重要的香精原料；花、葉藥用治目赤腫痛，並有止咳化痰之效。繁殖方法為壓條和扦插。



花名: 含笑花 學名: *Michelia figo* 科: 木蘭科

原產於廣東和福建。含笑花有一種獨特而濃烈香蕉味的香氣，用作為觀賞植物，為庭園帶來香氣。含笑花可常年開花，花色從白色、乳黃色到紫色不等。花期為 3-5 月，果期為 7-8 月。含笑花可用扦插、圈枝繁殖和嫁接法等方式繁殖。



樹名: 大葉相思 學名: *Acacia auriculiformis* 科: 含羞草屬 屬: 金合歡屬

原產於巴布亞紐幾內、澳北部及紐西等地。本種生長迅速，耐旱適應力強，能於貧瘠土地上生長，可作防護、園林之用，同為蜜樹種。



樹名: 紅膠木 學名: *Tristania conferta* 科: 桃金娘科屬: 紅膠木屬

原產地在澳洲的布里斯班市，較宜在蔭蔽而疏散的土壤中生長，能抑減林地雜草生長，遭生山火焚燒後再生能力很強，為舊日"植樹三寶"之一，亦為白蟻所愛好寄居樹木。



花名: 百合花 學名: *Lilium* 科: 百合科

主要分布在亞洲東部、歐洲、北美洲等北半球溫帶地區。夏季短暫休眠後，越冬後莖伸長開花。百合花常有香味，有白、黃、橙、粉、紅、紫、等色。百合花外表高雅純潔，有百年好合及百事合意之意，中國自古視為婚禮必不可少的吉祥花卉。



花名: 丁香花 學名: *Syringa* 科: 木犀科

主要分佈於歐洲東南部、阿富汗和中國等地。丁香花大多供觀賞用，有些可提制芳香油，亦為蜜源植物，木材供建築和家具用。大部分可以人工栽培和種植，通常的繁殖方法有播種、扦插、嫁接、分株、壓條繁殖。翌春播種，夏季用嫩枝扦插，成活率很高。



樹名: 羊蹄甲 學名: *Bauhinia variegata* 科: 豆 屬: 羊蹄甲

原產於中南部、印及馬來半。於每年3月至5月落葉後開花，花有5枚粉紅色的花瓣，其中1枚有深紅色條紋，具有香氣。




樹名: 洋紫荊 學名: *Bauhinia x blakeana* 科: 豆 屬: 羊蹄甲

原產於香及印地區。一塊兩瓣，似或圓形，頂端似羊蹄。花洋，似荊，有五片花瓣及五支公蕊。每年 2-4 月開花，多花少葉。對地形適應性比較好可以抵抗大氣污染。97 後區政府用洋紫荊作區徽，區旗的圖案。



花名: 荷花 學名: *Nelumbo nucifera* 科: 蓮科

原產亞洲熱帶和溫帶地區。荷花種植在池塘或河流底部的淤泥上，但其葉子和花仍保持乾淨，這就是自潔的效果，故有出淤泥而不染之意。荷花是澳門的區花，還是印度和越南的國花。花一般盛開於夏季，荷花也因而成為夏日之風物。



花名: 睡蓮 學名: *Nymphaea tetragona* 科: 睡蓮科

在北半球廣泛分布，如東亞(如中國、日本、蒙古等)及北歐等地。睡蓮的葉子和花浮在水面上。睡蓮秋季開白色花，午後開放，晚間閉合，可以連續開閉三四日。睡蓮因晝舒夜卷，而被譽為「花中睡美人」。睡蓮的用途甚廣，可用於製茶、插花、藥用等。



樹名: 印度榕 學名: *Ficus elastic* 科: 桑屬: 榕

屬雙子葉植物的印度榕含有白色黏液的乳汁，所以成為早期橡的來源，因而被人誤疑為橡膠的一種，花果期為每年9月到11月。印度榕原產錫、印東北部、緬、馬來西北部、印度尼西等地。



樹名: 石栗 學名: *Aleurites moluccana* 科: 大戟 屬: 石栗屬

樹皮暗灰色，淺縱裂至近乎光滑。小枝有星狀細毛或絨毛。花為聚傘花序，花乳白色至乳黃色。花期為 4-10 月，果期為 10-12 月。原生於馬來西及波里尼西等地[6]，現分布於廣東、廣西、雲南。喜日光充足，土壤肥沃及排水良好的沙壤土，能抗乾旱但不耐寒，枝條抗風性弱易風折。



花名: 鳳眼藍 學名: *Eichhornia crassipes* 科: 雨久花科

原產於南美洲亞馬遜河流域。藍紫色的鳳眼藍繁殖迅速，在合適的條件下兩個星期即可繁殖一倍，主要透過根莖及種子兩種方式繁殖。花期為 7-10 月，果期為 8-11 月。全株也可供藥用，有清涼解毒、除濕祛風熱以及外敷熱瘡等功效。



花名: 萬壽菊 學名: *Tagetes erecta* 科: 菊科

原產墨西哥，中國各地均有栽培，可生長在海拔 1150 米至 1480 米的地區。萬壽菊常於春、夏季播種。主要透過扦插於夏季來繁殖。花色有白、黃至橙紅各種色彩，色彩繁多。葉緣具腺點，會釋放異味，故又稱為「臭菊」。



樹名: 台灣相思 學名: *Acacia confusa* Merr. 科: 含羞草屬 屬: 金合歡屬

原產於台南部、中南方及東南一帶。相思樹生長在較乾旱的地區，為了減少水分蒸發量，必須有自我保護的機制，就跟仙人掌一樣。相思樹的樹幹非常堅硬，可作為薪材，故稱為相思，而且可燃燒許多時間。



樹名: 夾竹桃 學名: *Nerium oleander* 科: 夾竹桃 屬: 夾竹桃屬

產於摩洛哥、葡萄、地中海地區及亞南部至雲。生長至 2-6 米高，在直立的枝上向外展開。特徵為葉輪生，蒴果呈圓柱狀，種子披褐色長毛。花期為 4 至 9 月，有白色、粉紅色或黃色，有五瓣花冠。偶然散發出甜香味。果長而窄，成熟會爆放大量種。夾竹桃具觀賞價值的中草藥。因為莖部像，花朵像桃，因而為名。



花名: 蝴蝶蘭 學名: *Phalaenopsis aphrodite* Rchb. F. 科: 蘭科

原產於亞熱帶雨林地區，並分佈在泰國、菲律賓及台灣等地。蝴蝶蘭植株從葉腋中抽出長長的花梗，並且開出形如蝴蝶飛舞般的花朵，深受花迷們的青睞，素有“洋蘭王后”之稱。



花名: 蝦仔花 學名: *Woodfordia fruticosa* 科: 千屈菜科

原產地為墨西哥，雲南、貴州和廣西等省均有分佈。花色鮮紅或稍帶桔紅色，像條條柳鞭懸掛著串串紅色的小蝦仔。花期為春、夏、秋三季。

以扦插法繁殖，四季皆可育苗，以春季為適期。



樹名: 木麻黃 學名: *Casuarina equisetifolia* 科: 木麻黃科屬: 木麻屬

花期為 4 至 5 月，果期為 7 至 10 月。常綠喬，高可達 20 米；灰綠色小枝細軟，似針葉，多節，每節有極退化的苞片狀葉 6 — 8 枚；初夏開花，雌雄同株或異株；球形果實，直徑 10 — 16 毫米，小堅，上部有翅。最佳的防風林，可植於海邊，樹高且堅硬。生長迅速，抗風力強，

是中國南方濱海防風固的常見樹種之一。



樹名: 大頭茶 學名: *Gordonia axillaris* 科: 山茶科 屬: 大頭茶屬

花期為每年十月至翌年一月。10-2 月開花，7-10 月果熟。常綠性喬木，老葉掉落前轉紅。喜溫暖多霧的生育地，常見於低中海拔近山脊處或較向陽的坡面。庭園綠化樹種，花大型耀眼。木材緻密，紅色，供建築及器具用材。果實成熟時，常吸引猴群來取食。



花名: 美人蕉 學名: *Canna indica* L. 科: 美人蕉科

原產美洲、印度、馬來半島等熱帶地區。主要品種有紅花美人蕉、黃花美人蕉及雙色鴛鴦美人蕉。花期及果期為 3-12 月。4-5 月份時進行播種或於 3-4 月進行塊莖繁殖。美人蕉的花語為堅實的未來。



花名: 樹頭菜 學名: *Crateva unilocularis* 科: 山柑科

分佈在緬甸、廣西、雲南及廣東等地。外形似香椿，是一種刺藤喬木的傘狀嫩尖，肥大鮮嫩，一般多在春季採摘食用。樹頭菜是營養價值很豐富的一種野生蔬菜。



樹名: 魚木 學名: *Crateva unilocularis* Buch.-Ham.科: 白花菜科 屬: 魚木屬

一年有兩次花期，主要在3月先長葉後開花，9月短暫開花及小量。主要分布於琉球群島、台以及廣，生長於海拔400米的地區，常生長在低山水旁、溝谷、平地以及石山密林中。高可達八公尺，側枝輪生。春末開花，花冠黃白色，花絲紅色細長。夏秋季結果，漿果卵形，橙褐色。

葉叢生枝端，倒卵形。密葉小喬木。



樹名: 大花紫薇 學名: *Lagerstroemia speciosa* 科: 千屈菜科 屬: 紫薇屬

於熱帶及亞熱帶的落葉喬木，盛產於印度，故此亦被稱為「印度之光」。喜高溫濕潤氣候，適應力強，能於不同土壤栽培，在香港隨處可見。花期為 5-7 月，而果期為 10-11 月。葉呈長橢圓形對生，尾尖脈清，可達 20 公分長，冬季葉色會漸變為橙紅色。夏季開花，花紫色，圓錐花序串生。圓球形木質蒴果，徑約 2.5cm，成熟時為暗褐，自裂成六片至七片。



花名: 紫玉蘭 學名: *Magnolia liliiflora* 科: 木蘭科

為中國特有植物，分佈在雲南、福建及湖北等地。紫玉蘭花朵艷麗怡人，芳香淡雅，外面紫色或紫紅，內面白色或粉紅。花期為 3-5 月，果期為 8-10 月。



花名: 香港茶 學名: *Camellia hongkongensis* 科: 山茶科

1849年，香港茶被依歷上校（Colonel Eyre）初次發現於扯旗山，後來在的薄扶林、聶高信山、柏架山等地亦有所發現。香港茶屬於香港瀕危植物。花鮮粉紅色而無柄，沒香味，花期從每年12月到3月。種子可用來製成肥皂、潤滑油及潤髮油。



樹名: 木棉 學名: *Bombax ceiba* 科: 木棉科 屬: 木棉屬

木棉是一種在熱帶及亞熱帶地區生長的落葉大喬，高約10—25公尺。樹幹基部密生瘤刺。枝輪生，葉互生。木棉的樹幹粗大，木質軟。每年2—4月份先開花，後長葉。花五瓣，倒卵形狀，兩面都有星狀毛，橙黃或橙紅色，通常在早春長出。花後結橢圓形碩果，約莫在5月時，果實會裂開，內裡的卵圓形種子連同由果皮內壁細胞延伸而成的白色棉絮會隨風四散。



樹名: 合歡樹 學名: *Albizia julibrissin* 科: 豆 屬: 合歡

合歡花產於中國東北至華南及西南部各省區。生於山坡或栽培。非洲、中亞至東亞均有分佈；北美亦有栽培。合歡花喜溫暖濕潤和陽光充足環境，氣微香，味淡。粉紅色的花絲，莢果偏，是城市行道樹、觀賞樹。



花名: 葉子花 學名: *Bougainvillea spectabilis* 科: 紫茉莉科

原產南美洲的巴西，大約在十九世紀三十年代才傳到歐洲栽培。花色有鮮紅色、橙黃色、紫紅色、乳白色等。花期由 11 月起至翌年 6 月。每逢新春佳節，綠葉襯托著鮮紅色片，彷彿孔雀開屏，格外璀璨奪目。葉子花還是一味中藥，有散瘀消腫的效果。



花名: 龍船花 學名: *Ixora chinensis* 科: 茜草科

原產於中國南方與馬來西亞一帶，一般常見的多數為橙紅色的花。為「沖繩三大名花」之一。花期為每年 3-12 月。主要的繁殖方式為扦插法，夏季以及秋季的盛花期因為生長比較迅速與茂盛，是最適當繁殖的時機。花語有爭先恐後之意。



樹名: 鳳凰木 學名: *Delonix regia* 科: 蘇木科 屬: 鳳凰木屬

生於亞熱帶地方的落葉喬木是香港市區常見品種。開花時花朵耀眼，猶如紅燄如火的花海。每朵鳳凰木擁有五片紅色花瓣色彩奪目，有裝飾和遮蔽太陽的作用。



花名: 蒲桃 學名: *Syzygium jambos* 科: 桃金娘科

東南亞原產的果樹，可以作為防風植物栽培，果實可以食用。花期為 3-4 月呈白色，果實成熟期為 5-6 月呈黃色。蒲桃可以採用種子繁殖、扦插繁殖和嫁接繁殖。




花名: 杜鵑 學名: *Rhododendron simsii* Planch. 科: 杜鵑花科

杜鵑在春季開花，有紅、淡紅、杏紅、雪青、白色等，產自中國江蘇、安徽、浙江和雲南等地。江西、安徽、貴州更以杜鵑花為省花。全株供藥用有行氣活血、補虛，治療內傷咳嗽及腎虛耳聾等疾病。杜鵑的繁殖方法有扦插、嫁接、壓條、分株、播種。



花名: 宮粉羊蹄甲 學名: *Bauhinia variegata* 科: 豆科

原產於中國南部、印度。在香港於春天及初夏開花，花期由 3-5 月，花粉紅色，由五塊分離的花瓣組成，其中一塊花瓣帶紅色及黃綠色條紋，花、花芽、嫩葉及幼果可供食用入藥，根皮煎劑可治療消化不良。繁殖多採用扦插或壓條、嫁接法，扦插於夏、秋季進行。



花名: 粉美人蕉 學名: *Canna glauca* L. 科: 美人蕉科

產於熱帶美洲及西印度群島。粉美人蕉是一種優良的園林綠化和城市濕地水景佈置的材料。花期長，耐水淹，在雨季豐水期和旱季枯水期都能安然無恙。顏色從粉、橙紅色及具帶紅色斑點等。花期為夏、秋季。



花名: 茶梅 學名: *Camellia sasanqua* 科: 山茶科

分佈於日本、台灣以及中國湖北省、江西省及江蘇省等地，屬中國原產的植物。日本神戶市亦以茶梅為市樹。花期由 11 月初開至翌年 3 月。喜光而稍耐蔭，忌強光，屬半陰性植物，茶梅較為耐寒，但盆栽一般以不低於-2°C 為宜，抗性較強，病蟲害少。茶梅採用單葉短枝扦插法，取材簡便，成活率高。



花名: 桃花 學名: *Prunus persica* 科: 薔薇科

桃花原產於中國中部、北部，現已在世界溫帶國家及地區廣泛種植，其繁殖以嫁接為主。花色有白、粉紅、紅等，每年 3-6 月份開花，具有很高的觀賞價值。桃花可製成桃花丸、桃花茶等食品。花語為愛情的俘虜。



花名: 海芋花 學名： *Alocasia macrorrhizos* 科: 天南星科

原產於美洲。作為觀賞植物時則被稱為滴水觀音，當環境濕度過大，會從闊大的葉片上往下滴水，外有一大型綠色佛焰苞，開展成舟型，如同觀音座像。四季都是花期，但在密陰的林下常不開花。



花名: 吊芙蓉 學名： *Dombeya wallichii* 科: 梧桐科

原產於東非及馬達加斯加等地，是一種秀麗的開花植物。冬季開花，花期為由 12 月至翌年 3 月。性喜陽光，種在半日照或全日照等地均生長迅速，可耐寒至攝氏零下 2 度，低關注度，於乾旱季節注意澆水即可。吊芙蓉略具香味，是一種蜜源植物，多見有蜜蜂及蝴蝶等採集，具極高觀賞價值。



花名: 鬱金香 學名: *Tulipa gesneriana* 科: 百合科

原產於土耳其，是土耳其、荷蘭、匈牙利等國的國花。一般於3月下旬至5月上旬開花。鬱金香被歐洲人稱為「魔幻之花」。花色有白、粉紅、洋紅、紫、黑、黃、橙等。紅色鬱金香代表著熱情的愛、愛的告白，而黑色鬱金香代表著騎士精神、憂鬱的愛、榮譽。



花名: 藍花楹 學名: *Jacaranda mimosifolia* 科: 紫葳科

分佈於阿根廷、玻利維亞、巴西以及中國等地。春至初夏開花，花期兩個月。南非行政首都比勒陀利亞有「藍花楹之城」的美譽，因為每當春天來臨，城中眾多的藍花楹開花使整個城市都變成藍色。花語為寧靜、深遠、憂鬱，在絕望中等待愛情。



花名: 桂花 學名: *Osmanthus fragrans* 科: 木樨科

桂花為亞熱帶樹種，原產於亞洲，中國廣西桂林市、江蘇省蘇州市及浙江省杭州市在內的 20 多個城市以桂花為市花。秋季開花，花色有乳白、黃、橙紅等色，極芳香。桂花亦分為四種，包括金桂、銀桂、丹桂及四季桂。



花名: 向日葵 學名: *Helianthus annuus* 科: 菊科

向日葵夏季開花，原產地為北美洲。是俄羅斯、烏克蘭、葡萄牙、秘魯及玻利維亞的國花，亦是日本北九州市的市花。向日葵種子即葵花籽，炒製後可做為零食食用，也可以榨葵花籽油用於食用，油渣可以做飼料。



花名: 白鶴芋 學名: *Spathiphyllum kochii* 科: 天南星科

原產於哥倫比亞、馬來群島及菲律賓，生於熱帶雨林中，為歐洲最流行的室內觀葉植物之一。生長慢，花期為 5-8 月。主要以供觀賞作用以及淨化空氣。花語是事業有成、一帆風順。



花名: 使君子 學名: *Quisqualis indica* 科: 使君子科

分佈於臺灣、中國及菲律賓等地。花為近傘房狀的穗狀花序，初開時為白色後轉變為紅色，花期初夏，果期秋末。使君子為古今中外著名的驅蟲藥。



花名: 花葉艷山薑 學名: *Alpinia zerumbet* 科: 薑科  
原產於中國和印度。花白色，邊緣黃色，頂端紅色，唇瓣廣展，花大而美麗並具有香氣。夏季 6-7 月開花。花葉艷山薑和繁殖可採用分莖法和組織培養法。



花名: 康乃馨 學名: *Dianthus caryophyllus* 科: 石竹科  
原產於地中海地區，主要分佈於歐洲以及中國福建、湖北等地，是最普遍的花卉之一。花期為 5~8 月，果期為 8-9 月。花色有粉紅、紫紅或白色等。



花名: 九里香 學名: *Murraya exotica* 科: 芸香科

產於雲南、貴州、湖南等地。透過種子、壓條及嫁接繁殖。花期為 4-8 月，秋後也開花，果期為 9-12 月。花白色，花柱黃色，果實橙黃至朱紅色。



花名: 粉葉羊蹄甲 學名: *Bauhinia glauca* 科: 豆科

分佈在印度、中南半島以及中國的貴州、廣東及江西等地。生於山坡樹林和灌叢中，春夏開白色帶粉紅色花，花絲、花柱粉紅色，盛開時花量大。枝葉藥用可治皮膚濕疹。



花名: 龍吐珠 學名: *Clerodendrum thomsonae* Balf. 科: 馬鞭草科  
分佈於熱帶非洲西部、墨西哥，中國有栽培。花萼白色，花冠深紅色，  
外果皮棕黑色。花期為 3-5 月。扦插於每年 5~6 月進行；播種可於每年  
的 3-4 月用淺盆播撒，第 2 年可開花。



花名: 鳳仙花 學名: *Impatiens balsamina* 科: 鳳仙花科  
原產中國、印度。花色有粉紅，大紅，紫色，粉紫等，於 7-10 月開花，  
為常見的觀賞花卉。鳳仙花種類包括頂頭鳳仙、矮生鳳仙及龍爪鳳仙。  
鳳仙花性喜陽光，怕濕，耐熱不耐寒。



花名: 海棠 學名: *Malus spectabilis* (Ait.) Borkh 科: 薔薇科

分佈於中國河北、山東、陝西、江蘇、浙江、雲南。是中國的特有植物，素有“國艷”之譽。主要變種有重瓣白海棠花及重瓣粉紅海棠花。

花期為 4-5 月，果期為 8-9 月。



花名: 水石榕 學名: *Elaeocarpus hainanensis* 科: 杜英科

分佈於南島、廣西、雲南及越南等，喜生於河邊及低濕地。花呈白色，花期為 6-7 月。水石榕為一雅致小喬木，常栽種於公園園林或池塘邊作為觀賞樹。



花名: 水鬼蕉 學名: *Hymenocallis littoralis* 科: 石蒜科

原產於美洲熱帶地區，西印度群島。花呈綠白色，有香氣，可用於庭院佈置或花境、花壇用材。花期為夏秋，蒴果卵圓形或環形，成熟時裂開。春天栽植時進行分球繁殖。



花名: 五星花 學名: *Pentas lanceolata* 科: 茜草科

原產熱帶和阿拉伯地區。五星花別稱兩繖花、繁星花及星形花等。花期在秋夏季，有粉紅、緋紅、桃紅、白色等花色，適用於盆栽及佈置花台、花壇及景觀佈置。



花名: 南美蟊蜚菊 學名: *Wedelia trilobata*(L.) Hitchc. 科: 菊科

原產美洲熱帶地區。全年開花，圓形蓮生長迅速，繁殖能力超強，很少有病蟲害發生。南美螺頓菊喜幹、熱環境，可以快速生長，迅速擴張其領地形成濃密的“地毯”。



花名: 百子蓮 學名: *Agapanthus africanus* Hoffmgg. 科: 百子蓮科

原產南非，中國各地多有栽培。盛夏至初秋開花，花色深藍色或白色，花期為7月-8月。5月至10月溫度需保持於20-25℃，11月至4月溫度則需保持於5-12℃。



花名: 炮仗花 學名: *Pyrostegia venusta* 科: 紫葳科

原產南美洲巴西。花期長，在雲南西雙版納熱帶植物園可長達半年，通常在 1-6 月。多植於庭園建築物的四周，攀援於涼棚上，初夏紅橙色的花朵累累成串，狀如鞭炮，故有炮仗花之稱。



花名: 石竹 學名: *Dianthus chinensis* 科: 石竹科

原產中國北方，俄羅斯西伯利亞和朝鮮也有。溫室盆栽可以花開四季，觀賞期較長，花色有白、粉、紅、粉紅、大紅、紫、淡紫、黃、藍等，五彩繽紛，變化萬端。花期為 5-6 月，果期為 7-9 月。